

FECHA INSERCIÓN

HORA

DATOS GENERALES

DIAGNÓSTICO MÉDICO

FACTORES DE RIESGO HTA DIABETES OBESIDAD NEOPLASIA ENF. HEMATOLÓGICA

HIGIENE DE MANOS

SOL. ALCOHÓLICA JABON NEUTRO JABON ANTISÉPTICO

ELECCIÓN DE CATÉTER

PERIFERICO CORTO RECTO PERIFERICO INTEGRADO CON ALARGADERA LINEA MEDIA PICC

PREPARACIÓN DE LA PIEL


ANTISÉPTICO **Clorhexidina Alc. 2%** SI NO ¿Cuál? Alcohol 70%

Povidona Yodada

CALIBRE CATÉTER 18 20 22 24

CATÉTER DE SEGURIDAD SI NO

LUGAR INSERCIÓN



MMII

LATERALIDAD

Dominante No dominante

APÓSITO Y ACCESORIOS

TIPO DE APÓSITO: **Transp. Semiperm** SI NO ¿Cuál? Gasa

Con refuerzo SI NO

FIJACIÓN DEL CATÉTER: Tiras estériles ¿Cuál? Sobre punto inserción

Ninguno

Alejadas del punto de inserción

ACCESORIOS: Alargadera Bioconector Tapón

Ninguno Llave de tres pasos Alargadera integrada en catéter

TRATAMIENTO ENDOVENOSO

ANTIBIÓTICO IV (1) Fec Inicio Fecha Fin

ANTIBIÓTICO IV (2) Fec Inicio Fecha Fin

ANTIBIÓTICO IV (3) Fec Inicio Fecha Fin

ELECTROLITOS SI NO

ANALGESIA SI NO

MEDICACIÓN EV DIRECTA SI NO

CATÉTER SIN MEDICACIÓN SI NO

VALORAR DIARIAMENTE SI SE PRECISA EL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO

MANTENIMIENTO DEL CATÉTER

FECHA								
MTO VIA	DÍA	1	2	3	4	5	6	7
CAMBIO APOSITO TRANSPARENTE								
CAMBIO APOSITO GASA								
USO DE CLORHEXIDINA								
POVIDONA IODADA // ALCOHOL								
GRADO DE FLEBITIS								
CAMBIO DE EQUIPOS								

LAVADO CON...	J. PRECARGADA							
	SALINO 10 ml.							
	SALINO 50 ml.							
	HEPARINA MONODOSIS							
SELLADO CON...	J. PRECARGADA							
	SALINO 10 ml.							
	SALINO 50 ml.							
	HEPARINA MONODOSIS							
	HEPARINA MULTIDOSIS							

DATOS DE RETIRADA

FECHA RETIRADA

HORA

- FIN DE TRATAMIENTO
- RETIR. ACCIDENTAL
- OBSTRUCCION
- EXTRAVASACION
- FLEBITIS
- DOLOR
- POR PROTOCOLO

ESCALA VISUAL DE VALORACIÓN DE FLEBITIS fzero

Sin dolor, eritema, hinchazón, ni cordón palpable.	0	NO signos de flebitis. OBSERVE punto de inserción
Dolor sin eritema, hinchazón, ni cordón palpable en la zona de punción	1	Posible signo de flebitis. OBSERVE punto de inserción
Dolor con eritema y/o hinchazón sin cordón palpable en la zona de punción	2	Inicio de flebitis. RETIRE el catéter
Dolor, eritema, hinchazón, endurecimiento o cordón venoso palpable <de 6 cm por encima del sitio de inserción.	3	Etapa media de flebitis. RETIRE el catéter y valore tratamiento
Dolor, eritema, hinchazón, endurecimiento, cordón venoso palpable >de 6 cm por encima del sitio de inserción y/o purulencia	4	Avanzado estado de flebitis. RETIRE catéter y valore tratamiento
Trombosis venosa franca con todos los signos anteriores y dificultad o detención de la perfusión	5	Tromboflebitis. RETIRE catéter e inicie tratamiento

Medicina Preventiva y Salud Pública. Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes
Gallant P and Schultz AA (2006)

CULTIVO PUNTA CATÉTER

GERMEN

Si se retira el catéter y se inserta uno nuevo es preciso cumplimentar una nueva hoja de registro

OBSERVACIONES:
